

# Vernoil®

## Ficha técnica



ECO

**Insecticida**

**Nº DE REGISTRO:** ES-00079

**COMPOSICIÓN:** Aceite de parafina  
80% EC

**FORMULACIÓN:**  
Concentrado emulsionable (EC)

**PRESENTACIÓN:** 20 L



**NATURAGRI**  
S O L U C I O N E S

Glorieta de Bilbao, 1, 1º dcha. • 28004 Madrid. ESPAÑA  
Tel.: (+34) 901 002 012 • [www.naturagri.es](http://www.naturagri.es)

## APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

CULTIVOS	Plaga	Dosis (l/ha)	Nº aplic	Intervalo aplic.	Vol Caldo (L/ha)	Etapa de aplic.
Aguacate	Cochinillas	20 - 30	2-4	7	1000-1500	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Pulverización foliar en presencia de plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros					
	Araña					
Almendro	Cochinillas	10 - 20	2-4	7	1000-1500	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5- 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Eriofidos					
Arbustos frutales	Cochinillas	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Incluye frambuesa, arándano, grosella, mora Pulverización foliar en presencia de plaga.
	Eriofidos					
Avellano, Castaño	Ácaros	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi
	Cochinillas					
	Eriofidos					
Caqui	Cochinillas	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a Ceroplastes spp
Cítricos	Eriofidos	20 - 30	2-4	7	1000-1500	Pulverización foliar en presencia de plaga.
	Cochinillas					
	Acaros					
Frutales de hueso	Piojo de San José	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
	Ácaros					Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi
	Eriofidos					Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
	Cochinilla Harinosa					Melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
Kiwi	Cochinillas	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Eficaz frente Pseudaulacaspis pentagona. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
Manzano	Eriofidos	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
	Psila					
	Pulgón Lanígero					
	Piojo de San José					
Nogal	Ácaros	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P. Ulmi
	Cochinillas					
Peral	Eriofidos	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl.
	Piojo de San José					
	Pulgón Lanígero					
	Psila					
	Ácaros					Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 1,5-2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi
Platanera	Pulgones	10 - 20	2-4	7	1000-1500	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar en pulverización foliar. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal: dosis de 15 - 37,5 l/ha. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
	Cochinillas					
Vid	Ácaros	10 - 20	2-4	7	1000-1500	Incluye: vid para uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a P.Ulmi
	Cochinillas					Incluye: vid para uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Targionia vitis, Parthelonecanium corni, Planoococcus spp.
	Eriofidos					Incluye: vid para uva de mesa y de vinificación. Aplicación estival en presencia de plaga. Aplicación invernal 2,5 l/hl. Eficaz frente a Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis

Aguacate, Almendro, Arbustos frutales, Avellano, Caqui, Castaño, Cítricos, Frutales de hueso, Kiwi, Manzano, Nogal, Peral, Platanera, Vid, (P.S. 20 días)

P.S (plazo de seguridad en días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. NP: No procede fijar plazo de seguridad.